

Адовелл Кидс



Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название препарата: Адовелл Кидс

Действующие вещества (МНН): витамин А+ витамин Д

Лекарственная форма: капли для приема внутрь

Состав:

Каждый мл содержит:

активные вещества: витамин А (в виде пальмитата) -1500 МЕ,

коле кальциферол (витамин Д3)-400 МЕ;

вспомогательные вещества: витамин Е, аскорбиновая кислота, метилпарабен, пропил парабен, натрия сахарин, пропилен гликоль, гюлиоксил 40 гидрированное касторовое масло, глицерин, натрия цитрат, лимонная кислота, бутилгидрокситолуол, тутти фрутти, очищенная вода.

Описание: прозрачный раствор с запахом тутти фрутти

Фармакотерапевтическая группа: витамины.

АТХкод:А11С.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Витамин А играет важную роль в функционировании ретина, росте и функции эпителиальной _ткани, росте костей, репродуктивной функции и в эмбриональном развитии. Витамин Дз-это регулятор гомеостаза кальция и фосфора.

Фармакокинетика

Обычные дозы витамина Дз почти полностью всасываются с пищей. В высоких дозах всасывается-½ витамина Дз,-остальное выводится с калом.

Остаток витамина Дз, который не метаболизировался, сохраняется в жировой ткани, поэтому имеет длительный биологический период распада.

Показания к применению

- дефицит витамина А и витамина Д
- рахит и рахитоподобные заболевания
- физическое недоразвитие грудных детей и детей старшего возраста.
- заболевания кожи и слизистых оболочек (например, псориаз, ихтиоз, дерматозы);
- ослабленные и/или часто болеющие дети

Способ применения и дозы

- при.рахите начинают 1 мл-2 мл (30-<30 капель) в сутки,
- недоношенные дети от 4 недель-1 мл- 2 мл (30-<30 капель) в сутки.

У детей до 1 месяца применять препарат только по назначению врача.

Побочные действия

Редко отмечается повышенная чувствительность к витамину А и/или Д. Симптомы гиперавитаминоза могут приводить к нарушениям:-

- со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, запоры, потеря аппетита, сухость полости рта, нарушение функции печени;
- со стороны мочевой системы: полиурия, мочекаменная болезнь
- со стороны скелетной системы: костные и суставные боли,
- кальцификация тканей, выпадение волос.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипervитаминоз А и/или Д, почечная недостаточность, состояния ослабленного всасывания.

В случае приема других препаратов содержащих витамины А, Д необходимо учитывать суммарные дозы витаминов с целью предотвращения передозировки.

Лекарственные взаимодействия

Противоэпилептические средства, рифампицин, неомицин, холестирамин, жидкий парафин - снижают ресорбцию витамина А и ДЗ. Одновременное применение с тиазидами повышает риск гиперкальцие_мии. Применение с сердечными гликозидами, может усиливать их токсическое действие. Витамин А в высоких дозах может усиливать действие пероральных противосвертв,вающих средств. Этретинат повышает действие препарата.

Особые указания

Избегать передозировки.

Осторожно применять у лиц с почечнокаменной болезнью. В ходе применения препарата не следует принимать большого количества пищи, богатой витамином А (например, печени).

Беременность и период лактации. Перед применением следует поинформировать врача о беременности или подозреваемой беременности, необходима консультация врача относительно возможности применения лекарства в период беременности и лактации.

Препарат не следует применять после истечения срока годности и следует хранить в недоступном для детей месте.

Передозировка

При передозировке препарата (гипervитаминозе) могут появиться следующие симптомы: слабость, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, головная боль, депрессия, психотические нарушения, атаксия, ступор.

Лечение после передозировки: Прервать применение-препарата. Принимать большое количество жидкости. Обратиться к врачу.

Форма выпуска

30 мл /15 мл флакон с градуированной пипеткой.

Условия хранения Хранить при температуре не выше 30°С, в защищенном от света месте. Не замораживать.

Срок годности

2года.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Произведено для:



Star pharma

Производитель:

LIFE FORD HEALTHCARE PVT. LTD.

(A GMP & ISO 9001 : 2008 Certified Company)

Kh. No. 242, Bahadarpur Khadar, Roorkee Road, Laksar, Distt. Haridwar (Uttarakhand) India.