



ОроВелл



Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: ОроВелл.

Международное непатентованное название: Нет.

Лекарственная форма: Капсулы.

Состав:

Одна капсула содержит

активные вещества:

Комплекс железа (III) гидроксида с полимальтозой,

эквивалентный элементарному железу 100 мг

фолиевая кислота ВР 500 мкг,

вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза, натрия лаурилсульфат,

состав оболочки: желатин, натрия лаурилсульфат, метилпарагидроксibenзоат, пропилпарагидроксibenзоат,

вода красители: пункцовый [Понсо 4R], азорубин, титана диоксид.

Описание

Твердые желатиновые капсулы № 2, с корпусом и крышечкой красного цвета с надписью «OroWell». Содержимое капсул – порошок темно-коричневого цвета с включением частиц светлого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, влияющие на кроветворение и кровь..

Препараты железа в комбинации с фолиевой кислотой.

Код АТХ В03АD

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Препарат ОроВелл , капсулы содержит железо в виде полимальтозного крплекса гидроокиси железа (III). Данный макромолекулярный комплекс стабилен и не выделяет железо в виде свободных ионов в желудочно-кишечном тракте. Структура комплекса сходна с естественным соединением железа-ферритомом.

После приема препарата внутрь железо хорошо абсорбируется из двенадцатиперстной и тощей кишки посредством обмена с железосвязывающими белками, находящимися в гастрointесимнальной жидкости и в эпителии слизистой желудочно-кишечного тракта. Степень абсорбции зависит от выраженности дефицита железа (чем больше дефицит, тем выше абсорбция). Биодоступность комплекса составляет около 10%.

Средний период полувыведения комплекса железа (III) гидроксида с полимальтозой составляет около 90 минут.

Железо, в основном, метаболизируется печеночной ретикулоэндотелиальной системой, а также трансферрином, апоферритином селезенкой и костным мозгом.

Выводится железо с калом, мочой и потом.

Фармакодинамика

Антианемический препарат. ОроВелл капсулы используются для коррекции железодефицитной анемии, что особенно часто наблюдается в период беременности и лактации. Комплекс железа (III) гидроксида с полимальтозой является неионизированной формой железа и не обладает проокисидантными свойствами, присущими солям железа (III). Фолиевая кислота относится к витаминам группы В и является необходимым компонентом при синтезе ДНК. Дефицит фолиевой кислоты приводит к возникновению анемии.

Прием препарата ОроВелл, капсулы стимулирует гемо- и эритропоз, нормализует гематологическое показатели, способствует нормализации концентрации железа и сыворотке крови, что приводит к постепенной регрессии клинических (слабость, утомляемость, головокружение, тахикардия, сухость кожных покровов) и лабораторных симптомов.

Показания к применению

- лечение и профилактика железодефицитной анемии, в т.ч. при беременности, в период лактации, у подростков, а также после хирургических вмешательств.

Способ применения и дозы

Дозировка препарата и продолжительность терапии зависят от выраженности дефицита железа.

ОроВелл, капсулы следует принимать во время или сразу после еды.

Для лечения железодефицитной анемии взрослым и детям старше 12 лет препарат назначают по 1 капсуле 2 раза в сутки.

После достижения требуемого уровня гемоглобина препарат назначается в течение нескольких месяцев по 1 капсуле 1 раз в сутки.

При беременности препарат рекомендуют принимать по 1 капсуле 1 раз в сутки, в течение всего периода.

Применение в педиатрии детям до 12 лет рекомендуется назначать препарат в форме сиропа.

Побочные действия

Ⓢ Ощущение переполнения и тяжести в эпигастральной области, тошнота, запоры, диарея

Ⓢ Крапивница, высыпания на коже

Противопоказания

Ⓢ Избыточное содержание железа в организме (гемохроматоз, гемосидероз)

Ⓢ Анемии, не связанные с дефицитом железа (гемолитическая, апластическая, мегалобластная анемии)

Ⓢ Нарушения утилизации железа (свинцовая анемия, сидероахрестическая анемия, талассемия)

Лекарственные взаимодействия

Антациды, фосфаты и тетрациклины могут препятствовать всасыванию железа, однако случаев значительного взаимодействия с лекарственными средствами выявлено.

Особые указания

При лечении препаратами железа может наблюдаться темное окрашивание стула не имеющее клинического значения.

Особенности влияния на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не оказывает влияния на осуществление деятельности, требующей повышенного внимания - вождение автомобиля и работа с техникой.

Передозировка

Симптомы: диарея и рвота.

Лечение: антидот - дефероксамин.

Форма выпуска и упаковка

По 20 капсул в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ и фольги алюминиевой.

По 2 контурные упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в почку картона.

Условия хранения

Хранить в сухом месте, при температуре не выше + 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения


2 года

Не применять препарат по истечении срока годности!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Произведено для:



Star pharma

Лондон, Великобритания

Производитель: