

Седивелл

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Седивелл.

Лекарственная форма: капсулы для приема внутрь.

Каждая капсула содержит:

Валериана индийская 125 мг

Мята перечная 25 мг

Мелисса лекарственная 25 мг

Фармакотерапевтическая группа: седативное средство растительного происхождения.

Код АТХ: N05CM.

Фармакологическое действие:

Седивелл- седативный препарат растительного происхождения. Оказывает седативное и спазмолитическое действие.

Фармакодинамика:

Комбинированный препарат растительного происхождения, действие которого обусловлено свойствами его компонентов. Биологически активные вещества валерианы (сложные эфиры борнеола и изовалериановой кислоты, валеропотриаты, алкалоиды — валерин и хотенин) обладают седативным, снотворным, спазмолитическим эффектами, снижают возбудимость ЦНС и вегетативной нервной системы, оказывают положительное влияние при симптомах раздражительности: беспокойстве, возбуждении и напряженности вследствие нервного перенапряжения; при бессоннице способствуют более быстрому засыпанию. Кроме того, комплекс биологически активных веществ валерианы оказывает желчегонное действие, усиливает секреторную активность слизистой оболочки ЖКТ, замедляет сердечный ритм и расширяет коронарные сосуды.

Мята перечная содержит эфирное масло, в состав которого входит ментол и его эфиры, кетон ментон, олеановая и урсоловая кислоты, флавоноиды. При приеме внутрь указанные компоненты мяты перечной рефлекторным путем за счет раздражения рецепторов слизистых оболочек оказывают умеренное спазмолитическое, седативное, снотворное, а также желчегонное действие, уменьшают тошноту, мягко стимулируют действие пищеварительных желез.

Основные действующие вещества мелиссы — компоненты эфирного масла: цитраль, гераниол, меналоол, пераль и другие оказывают седативный, противосудорожный, гипотензивный, антиаритмический, спазмолитический и противорвотный эффекты. Кроме того, активные компоненты мелиссы улучшают процессы пищеварения, оказывают мягкий желчегонный эффект, нормализуют сниженный аппетит, способствуют восстановлению сапрофитной флоры кишечника и секреции пищеварительных ферментов. Компоненты мелиссы также устраняют легкие формы дисменореи, проявления токсикоза беременности, климактерических расстройств, нормализуют функцию половых желез у мужчин.

Фармакокинетика:

Действие препарата является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

Показания к применению:

- легкие формы неврастении и неврозы, которые сопровождаются раздражительностью, беспокойством, страхом, усталостью, нарушением внимания и памяти, психическим истощением;
- легкие формы расстройства сна, связанные с возбуждением;
- приступы головной боли и мигрени, обусловленные нервным перенапряжением;
- легкие формы дисменореи;
- климактерический синдром;
- функциональные заболевания органов пищеварения (дискинезия желчевыводящих путей, диспептический синдром, синдром раздраженного толстого кишечника);
- нейроциркуляторная дистония с тахикардией;
- артериальная гипертензия I стадии;

- постоянное психическое напряжение.

Противопоказания:

- гиперчувствительность к составу препарата;
- дети младше 12 лет.

Способ применения и дозы:

Взрослым и подросткам старше 12 лет при нервозности - по 1-2 капсуле 2-3 раза в день, *при бессоннице* - по 1-2 капсуле за час до отхода ко сну. Максимальная суточная доза препарата Седивелл – 6 капсул, рекомендуется принимать в 3 приема. Продолжительность приема и повторяемость курсов терапии зависят от конкретного показания к применению, выраженности и формы патологического процесса, возраста больного.

Курс терапии в среднем может составлять от 2 недель до 2 месяцев. В течение года курсы терапии могут повторяться.

Побочное действие:

Обычно хорошо переносится, но при превышении рекомендуемых доз возможно развитие вялости, подавленности, слабости, снижение работоспособности и концентрации внимания, сонливости, головокружения.

Возможно: аллергические реакции; при длительном применении – запор.

Передозировка:

При передозировке могут наблюдаться выраженные побочные реакции: головная боль, головокружение, сонливость, общая слабость, боль в животе, тошнота, снижение остроты слуха и зрения, тахикардия.

В случае передозировки следует прекратить применение препарата и принять меры экстренной помощи (промывание желудка, введения активированного угля), симптоматической и поддерживающей терапии, в соответствии с клиническим состоянием больного.

Лекарственное взаимодействие:

При одновременном применении препарата Седивелл с другими лекарственными средствами, угнетающими ЦНС (в т.ч. снотворными препаратами, гипотензивными средствами центрального действия, анальгетиками), а также алкоголем возможно усиление действия на ЦНС (может потребоваться коррекция доз).

Особые указания:

Применение препарата при беременности и в период лактации не изучено. Назначение препарата при беременности (особенно в I триместре) и в период грудного вскармливания возможно только в случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца. При отмене препарата не возникает синдром отмены.

Применение препарата Седивелл в рекомендованных дозах не влияет на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.

Форма выпуска:

30 капсул во флаконе вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

Срок хранения:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.