Трифен-ДУО

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Трифен-ДУО.
Международное непатентованное название: Трипсин + Химотрипсин.
Лекарственная форма: таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.
Состав: каждая таблетка покрытая кишечнорастворимой оболочкой содержит:
Ферментативную активность 100000 AU
очищенный концентрат, имеющий Трипсин и Химотрипсин в соотношении примерно шесть к одному.
Краситель: Желтый оксид железа.
Фармакотерапевтическая группа: ферменты в комбинациях.
Код АТХ: M09AB52.
Фармакологические свойства:
Фармакодинамика:
Протеолитическое комбинированное средство белковой природы. Получают из поджелудочной железы крупного рогатого скота.
Трипсин - ферментный препарат протеолитического действия, получаемый из поджелудочной железы крупного рогатого скота. Трипсин обладает выраженными противовоспалительными и противоотечными свойствами, способен расщеплять омертвевшие участки тканей, фибринозные образования, вязкие секреты и экссудаты. По отношению к здоровым тканям фермент неактивен и безопасен в связи с наличием в них ингибиторов трипсина (специфических и неспецифических). Не влияет на систему гемостаза.
Химотрипсин - протеолитический фермент, получаемый из поджелудочной железы крупного рогатого скота, гидролизует преимущественно связи, образованные остатками тирозина, фенилаланина и другими ароматическими аминокислотами. Расщепляет пептидные связи в молекуле белка и продуктах его распада. Обладает противовоспалительным действием, поскольку факторы воспаления представляют собой белки или высокомолекулярные пептиды (брадикинин, серотонин, некротические продукты и др.). Лизирует некротизированные ткани, не оказывая действия на жизнеспособные клетки, вследствие наличия в них специфических антиферментов.
Фармакокинетика:
Не изучалась.
Показания к применению:
- рассасывание воспалительного отека;
- гематома;
- боли при случайных или операционных травмах;
- эпизиотомия, востановление после кесарева сечения, гистерэктомия;
- переломы, травмы мышц и сухожилий,
- грыжа межпозвоночных дисков (радикулит);
- уменьшения некротических повреждений и для улучшения проникновения антибиотиков при хронических респираторных заболеваниях.

Противопоказания:
- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- язвенная болезнь, тяжелые заболевания печени или почек;
- механизмы нарушения свёртывания крови, и геморрагические диатезы;
- пациенты получающие антикоагулянты.

Способ применения и дозы:
Принимать внутрь по 1 таблетке Трифен-ДУО 4 раза в день, за полчаса до еды или по указанию врача. Таблетки нужно проглотить не разжевывая. Лечение следует начинать как можно раньше после травмы. Курс лечения по указанию врача.
Побочные действия:
Возможны аллергические реакции, повышение температуры тела до субфебрильной, тахикардия.
Редко: расстройства желудка.
Передозировка:
При случайной передозировке не представляет риска развития нежелательных побочных действий и передозировка маловероятна.
Лекарственные взаимодействия:
При одновременном применении с препаратами железа возможно уменьшение абсорбции железа.
Особые указания:
Беременность и период лактации:
В периоды беременности и кормления грудью к применению препарата следует относиться с обычной для этого состояния осторожностью. Применение возможно после оценки врачом соотношения польза для матери / риск для плода / ребенка.
С осторожностью использовать пациентам с чувствительностью к ферментам.
Форма выпуска:
20 таблеток покрытых кишечнорастворимой оболочкой в каждом блистере. Один блистер вместе с инструкцией по применению картонной упаковке.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.
Срок годности:
Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска:
По рецепту врача.

Произведено для:
Star pharma
Лондон, Великобритания
Производитель: