

Флюдоксол

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название препарата: Флюдоксол сироп.
Международное непатентованное название: Амброксол + Левоцетиризин.
Лекарственная форма: сироп для приема внутрь.
Состав:
Флюдоксол сироп.
Каждые 5 мл содержат:
Амброксола гидрохлорид ВР 30 мг;
Левоцетиризина гидрохлорид ВР 5 мг.
Фармакотерапевтическая группа: муколитическое и антигистаминное лекарственное средство.
Код АТХ: R05CB10.
Фармакологическое действие:
Фармакодинамика:
Амброксол является муколитическим средством. Обладает секретомоторным секретолитическим и отхаркивающим действием; стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, увеличивает содержание слизистого секрета и выделение поверхностно-активного вещества (сурфактанта) в альвеолах и бронхах; нормализует нарушенное соотношение серозного и слизистого компонентов мокроты. Активируя гидролизующие ферменты и усиливая высвобождение лизосом из секреторных клеток, снижает вязкость мокроты. Повышает двигательную активность мерцательного эпителия, увеличивает мукоцилиарный транспорт. После приема внутрь действие развивается через 30 мин и продолжается в течение 6-12 ч.
Левоцетиризин является противоаллергическим средством. Левоцетиризин - антигистаминный препарат, селективный антагонист H1 - рецепторов, который не имеет заметного антихолинергического и антисеротонинового действия. Левоцетиризин не проникает через гематоэнцефалический барьер. Левоцетиризин тормозит раннюю фазу аллергической реакции, а также уменьшает миграцию клеток воспаления, таких как эозинофилы; подавляет выделение медиаторов, которые участвуют в поздней аллергической реакции. Левоцетиризин значительно снижает гиперактивность бронхального дерева, которое возникает в ответ на высвобождение гистамина у больных бронхиальной астмы. Эти эффекты препарата не сопровождаются центральным действием, что подтверждается психометрическими тестами и данными ЭКГ.
Фармакокинетика:
После приема внутрь амброксол очень хорошо всасывается. Смах в плазме крови достигается через 0,5-3 ч. Связывание с белками плазмы - 80%. Проникает через ГЭБ, плацентарный барьер, выделяется с грудным молоком. Метаболизируется в печени с образованием дибромантраниловой кислоты и глюкуроновых конъюгатов. T1/2 составляет 1,3 ч. Выводится почками: 90% - в виде водорастворимых метаболитов, 5% - в неизменном виде.
Левоцетиризин быстро всасывается при приеме внутрь, период полувыведения у взрослых составляет 7,9 ± 1,9 часа. Левоцетиризин и его метаболиты в основном выводятся из организма с мочой.
Фармакокинетика в особых клинических случаях: T1/2 увеличивается при тяжелой хронической почечной недостаточности, не меняется при нарушении функции печени.
Показания к применению:

- заболевания дыхательных путей с выделением вязкой мокроты;
- бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты;
- острый и хронический бронхит;
- пневмония;
- бронхоэктатическая болезнь;
- хронические обструктивные болезни легких.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- тяжелые заболевания почек;
- беременность и лактация (грудное вскармливание).

С осторожностью назначают лекарство при хроническом пиелонефрите средней и тяжелой степени тяжести, при почечной недостаточности (требуется коррекция режима дозирования), лицам пожилого возраста (из-за возможного снижения клубочковой фильтрации у этой категории пациентов).
Способ применения и дозы:
Препарат Флюдоксол назначают внутрь, во время приема пищи, запивая небольшим количеством жидкости.
Взрослым рекомендуется по 5 мл сиропа Флюдоксол (30 мг амброксола 5 мг левоцетиризина в 5 мл) 2 раза в день.
При лечении, продолжающемся более 7-14 дней, дозу уменьшают в 2 раза.
Не рекомендуется применять без врачебного назначения более чем в течение 4-5 дней.
Во время лечения необходимо употреблять много жидкости (соки, чай, вода), так как она усиливает муколитический эффект препарата.
Побочные действия:
Препарат обычно хорошо переносится. Редко отмечаются реакции повышенной чувствительности, слабость, головная боль, гастралгии, чувство переполнения в желудке, тошнота, рвота, нарушение пищеварения. Эти явления носят временный характер и требуют отмены препарата.
Передозировка:
Симптомы: тошнота, рвота, диарея, диспепсия, сонливость, заторможенность, слабость, головная боль, тахикардия, повышенная раздражительность, задержка мочеиспускания, утомляемость (чаще всего при приеме цетиризина в суточной дозе 50 мг).
Лечение: искусственная рвота, промывание желудка в первые 1-2 ч после приема препарата, прием пищи, содержащей жиры или назначают активированный уголь.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Флюдоксол можно комбинировать с другими препаратами. Данные о нежелательных проявлениях лекарственного взаимодействия отсутствуют.
Совместное применение с противокашлевыми препаратами приводит к затруднению отхождения мокроты на фоне уменьшения кашля. Увеличивает проникновение в бронхальный секрет амоксициллина, цефуроксима, эритромицина и доксициклина.
Особые указания:
Препарат может влиять на клиническую картину при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Форма выпуска:
Флюдоксол 30 мг / 5 мг: сироп для приема внутрь в пластиковом флаконе янтарного цвета 100 мл, вместе с мерным стаканчиком и инструкцией по применению в картонной упаковке.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.
Срок годности:
Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска:
Без рецепта.

Производитель: