

Гапагламин

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название препарата: Гапагламин.

Международное непатентованное или группировочное наименование: Габапентин + Метилкобаламин

Лекарственная форма: Таблетка.

Состав:

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:

Габапентин USP..... 300мг

Метилкобаламин USP.....500мкг

Фармакологические свойства:

Габапентин является структурным аналогом ГАМК, участвует наряду с ним в передаче и модуляции боли, при этом не связывается с ГАМКА- и ГАМКВ-рецепторами, не действует на деградацию медиатора посредством одноименного фермента. Взаимодействуя с высокоспецифичными белковыми мишенями в неокортексе, Габапентин проявляет выраженную антиконвульсантную активность, устраняет нейропатическую боль на центральном и периферическом уровне. Противосудорожное и анальгетическое действие препарата основано на устранении глутаматзависимой гибели нейрональных клеток путем ингибирования синтеза глутамата. Препарат способствует повышению синтеза ГАМК в ЦНС, подавляя при этом высвобождение возбуждающих нейромедиаторов. Механизм купирования нейропатической боли габапентином основан на связывании с $\alpha 2$ -субъединицей кальциевых каналов. Результатом этого взаимодействия является снижение потока кальция внутрь клеток и уменьшение ПД мембран аксонов. Габапентин увеличивает концентрацию ГАМК в цитоплазме нейронов, повышает количество плазменного серотонина. Метилкобаламин - коферментная форма витамина B12. Участвует в процессах метилирования, в синтезе белков и нуклеиновых кислот, в обмене углеводов и липидов. Стимулирует монооксигеназную систему, оказывает защитное действие на SH-группы и активирует глутатионтрансферазы печени. При заболеваниях периферической нервной системы уменьшает болевой синдром, способствует восстановлению двигательных функций и уменьшению вегетативных нарушений. Оказывая гепатопротекторное действие, благоприятно влияет на функцию печени при токсическом гепатите, циррозе печени, панкреатите. Уменьшает поражение суставов при адьювантном артрите, оказывает гемопозитическое действие

Показания к применению:

Монотерапия фокальных судорог при эпилепсии У взрослых и детей с 12 лет; дополнительное лечение фокальных судорог при эпилепсии у взрослых; нейропатические боли (невралгия постгерпетическая, диабетическая, тригеминальная, ВИЧ обусловленная, алкогольная, при стенозе спинномозгового канала).

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Противопоказан в возрасте до 12 лет при парциальных судорогах. Для лечения нейропатической боли не назначать детям и подросткам младше 18 лет.

Применение:

Внутрь, независимо от приема пищи по 1-3 таблетки в день. Начинают лечение с 1 таблетки в первый день, затем увеличивать на одну таблетку в день.

Побочное действие:

Со стороны ЦНС: сонливость, утомляемость, головокружение, гипервозбудимость, атаксии, тремор конечностей и нистагм. Реже возникают крапивницы, астенический синдром, расстройства мышления и парестезии. Со стороны сердечнососудистой системы: тахикардия и снижение САД. Со стороны респираторного тракта: редко отмечаются фарингит и ринит. Со стороны мочевыделительной системы: возможно недержание мочи. Со стороны органов зрения и слуха: редко отмечаются диплопия, амблиопия субъективное чувство звона в ушах. В картине крови прием может провоцировать появление лейкопении. Аллергические реакции при использовании препарата могут проявляться в виде экзантемы с зудом и покраснением вплоть до синдрома Стивенса-Джонсона.

Особые указания:

Отсутствуют данные о применении препарата у беременных женщин, поэтому его следует использовать во время беременности только в том случае, если предполагаемая польза для матери оправдывает возможный риск для плода. Габапентин выводится с грудным молоком, влияние его на вскармливаемого ребенка неизвестно, поэтому во время лечения следует отказаться от грудного вскармливания. Отмену препарата следует проводить постепенно.

Форма выпуска:

10 таблеток в блистере и один такой блистер в картонной упаковке с инструкцией.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

По рецепту врача.

Произведено для:



Лондон, Великобритания

Производитель: